

مياتريزين

محلول عيني عقيم

التركيب:

كل امل من محلول مياتريزين العيني العقيم يحوي سيتريزين ٢,٤ملغ (تكافئ سيتريزين هيدروكلوريد ٢,٨٥ملغ)، بنزالكونيوم كلورايد ٠,١ملغ كمادة حافظة.

السواغات:

إيدينات ثنائية الصوديوم، غليسرين، هيبروميلوز، بولي إيثيلين غليكول ٤٠٠، بولي سوريات ٨٠، فوسفات ثنائية الصوديوم، حمض كلور الماء و/أو هيدروكسيد الصوديوم، ماء معد للحقن.

آلية التأثير:

يعد مياتريزين مناهض لمستقبلات الهيستامين-١ (H₁)، ومثبطاً لتحرر الهيستامين من الخلايا البدينة، حيث يحدث تأثيره عن طريق التثبيط الانتقائي لمستقبلات الهيستامين H₁.

الحرائك الدوائية:

عند تطبيق قطرة واحدة في كل عين من محلول سيتريزين العيني ٢,٤% لدى متطوعين أصحاء، تم الحصول على تركيز بلازمي أعظمي C_{max} يصل إلى ١,٧ نانوغرام/مل بعد الجرعة الوحيدة و ٣,١ نانوغرام/مل بعد تطبيق الجرعة مرتين في اليوم لمدة أسبوع واحد. وصل متوسط العمر النصفى للسيتريزين إلى ٨,٦ ساعة بعد إعطاء جرعة وحيدة و ٨,٢ ساعة عند تطبيق الجرعة مرتين في اليوم لمدة أسبوع.

الاستجابات:

يُستلَب محلول مياتريزين العيني العقيم لعلاج الحكة العينية المترافقة مع حالات التهاب الملتحمة التحسسي.

الجرعة وطريقة الإعطاء:

قطرة واحدة من محلول مياتريزين في كل عين مصابة مرتين في اليوم (بفاصل ٨ ساعات تقريباً).

مضادات الاستطباب:

لا يوجد.

التحذيرات والاحتياطات:

تلوث رأس القطرة و المحلول

كما في أي قطرة عينية، يجب توخي الحذر لعدم تلامس رأس القطارة مع الجفون أو المناطق المحيطة حرصاً على عدم حصول تلوث رأس القطرة و المحلول. ابق العبوة مغلقة باحكام في حال عدم الاستخدام.

ارتداء العدسات اللاصقة

• يجب توجيه المرضى بعدم وضع العدسات اللاصقة في حال وجود احمرار في العينين.
• يجب عدم تطبيق قطرة مياتريزين خلال وضع العدسات اللاصقة.
• انزع العدسات اللاصقة قبل تطبيق قطرة مياتريزين، المادة الحافظة بنزالكونيوم كلورايد قد تُدمص على سطح العدسات اللاصقة. من الممكن إعادة وضع العدسات بعد ١٠ دقائق من تطبيق مياتريزين.

الحمل والإرضاع:

الحمل: لا توجد دراسات مناسبة ومضبوطة بشكل جيد حول تطبيق محلول سيتريزين العيني لدى النساء الحوامل. يجب استخدام مياتريزين لدى النساء الحوامل فقط في حال كانت الفائدة المرجوة تفوق الخطورة المحتملة على الجنين.
الإرضاع: أشارت الدراسات إلى ظهور سيتريزين في حليب المرضعات بعد الإعطاء الفموي. لكن، من غير المعروف فيما إذا كان الامتصاص الجهازى الناتج عن التطبيق العيني الموضعي لمحلول سيتريزين ممكن أن يُنتج كميات قابلة للكشف في الحليب البشري.
لا توجد معلومات كافية عن تأثيرات سيتريزين على الرضع أو التأثيرات على إنتاج الحليب لتهتم الإبلاغ عن خطر مياتريزين على الرضع أثناء الإرضاع.
يجب أن تؤخذ الفوائد الصحية للإرضاع و أي تأثيرات جانبية محتملة على الرضيع في الحسبان مع الحاجة السريرية للأم المرضع لتطبيق مياتريزين.

الآثار الجانبية:

تعد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لدى استخدام محلول مياتريزين العيني: احترقان العين، ألم موضع التطبيق، انخفاض حدة البصر.

شروط الحفظ:

يُحفظ بدرجة حرارة (١٥ - ٢٥)°م.

التعبئة:

يُعبأ محلول مياتريزين في عبوة من البولي إيثيلين ٥مل مزودة بقطارة، محكمة الإغلاق بواسطة غطاء من البولي إيثيلين، ضمن عبوة كرتونية.

إنتاج مياميد للصناعات الدوائية - ريف دمشق - سوريا

إن هذا الدواء
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك لأخطار كثيرة.
- الطبيب والصيدلاني فقط هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المخصصة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لائترت الادوية في متناول ايدي الاطفال

(اتحاد الصادلة العرب)

(مجلس وزراء الصحة العرب)

