

فينزوميا

محلول عيني عميق

التركيب:

كل امل من محلول **فينزوميا** العيني يحوي نافازولين هيدروكلوريد ٢٥،٠ ملغ، فينيرامين ماليت ٣ ملغ، كما يحوي بنزالكونيوم كلورايد ٠،١٪ كمادة حافظة.

السواغات:

حمض البور، ايديتات ثنائية الصوديوم، بورات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم و/أو حمض كلور الماء كمية كافية لضبط درجة الحموضة، ماء معد للحقن كمية كافية حتى ٥ مل

الاستطباب:

يستطب محلول **فينزوميا** العيني للتخفيف المؤقت من احمرار وحكة العين (العيون) الناتج عن أحد عوامل التحسس (غبار الطلع، العشب، وبر الحيوانات...)

مضادات الاستطباب:

في حال وجود حساسية لأحد مكونات المستحضر، أو في حال تغير لون المحلول أو أصبح عكر.

الجرعة:

البالغون والأطفال بعمر ٦ سنوات وأكثر: قطرة أو قطرتين في العين (العيون) المصابة حتى ٤ مرات يومياً.
الأطفال أقل من ٦ سنوات: يجب استشارة الطبيب

التحذيرات والاحتياطات:

- للاستخدام الخارجي فقط.
- قد تتسع الحدقة مؤقتاً مسببة الحساسية للضوء.
- لا يجب استخدام محلول **فينزوميا** العيني في حال وجود حساسية لأحد مكونات المستحضر، أو في حال تغير لون المحلول، أو أصبح عكر.
- يجب استشارة الطبيب قبل استخدام محلول **فينزوميا** العيني في حال كان المريض يعاني من: زرق ضيق الزاوية، مرض قلبي، ارتفاع في ضغط الدم، مشاكل في التبول
- يجب إيقاف استخدام محلول **فينزوميا** العيني في حال وجود ألم في العين، أو حدوث تغير في الرؤية، أو تطور احمرار وتهيج العين، استمر لأكثر من ٧٢ ساعة
- يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل تطبيق محلول **فينزوميا** العيني
- لمنع تلوث المحلول، يجب تجنب ملامسة رأس القطرة لأي سطح.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

الأثار الجانبية:

تتمثل الأثار الجانبية المرتبطة باستخدام محلول **فينزوميا** العيني بتوسع الحدقة بشكل مؤقت مما يسبب حساسية للضوء

فرط الجرعة:

- قد يؤدي فرط استخدام محلول **فينزوميا** العيني إلى زيادة احمرار العين.
- في حال ابتلاع المستحضر، يجب الحصول على المساعدة الطبية بشكل مباشر.
- قد يؤدي الابتلاع العرضي لمحلول **فينزوميا** العيني لدى الرضع والأطفال إلى غيبوبة وانخفاض ملحوظ في درجة حرارة الجسم.

شروط الحفظ:

يُحفظ في درجة حرارة (٢٠-٢٥) °م، محمياً من الضوء.

التعبئة:

يُعبأ محلول **فينزوميا** العيني في عبوة من البولي ايثيلين ٥ مل مزودة بقطارة، محكمة الإغلاق بواسطة غطاء من البولي ايثيلين ضمن عبوة كرتونية

إنتاج مياميد للصناعات الدوائية - ريف دمشق - سوريا

إن هذا الدواء
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك لأخطار كثيرة.
- الطبيب والصيدلاني فقط هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المخصصة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لاتترك الادوية في متناول أيدي الأطفال

(اتحاد الصادلة العرب)

(مجلس وزراء الصحة العرب)

